



# LACVIT MAIGRE

Aliment complémentaire de lait entier pour veaux d'élevage

## 1. INTERETS

Formule adaptée à l'alimentation (partielle) des veaux nourris au lait maternel. Cet aliment peut servir tant en alimentation des veaux de boucherie que lors de l'utilisation du lait entier pour les veaux d'élevage.

## 2. INGREDIENTS ET CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Lactosérum, Farine de blé, Gluten de blé, Chlorure de sodium, Sulfate de magnésium, Hydroxyde de magnésium, carbonate de calcium

### Constituants analytiques (au kg brut)

Humidité : 5 %  
Protéines brutes : 14 %  
Matières Grasses brutes : 1 %  
Cellulose brute : 0,2 %  
Cendres brutes : 8 %

### Vitamines et oligo-éléments

Vitamine A : 25 000 UI  
Vitamine D3 : 10 000 UI  
Vitamine E : 80 mg/ kg  
Vitamine B1 : 15 mg  
Vitamine C : 180 mg/ kg  
Vitamine K3 : 5 mg  
Cuivre : 12 mg/ kg

## 3. UTILISATION

La buvée du veau doit se faire à une température de 40 à 45 °C. Il peut être nécessaire de prédiluer l'aliment complémentaire dans un peu d'eau très chaude (60-65 °C) afin de remonter la température finale du lait donné au veau.

## 4. RECOMMANDATIONS

A conserver à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur, dans un endroit propre et sec.  
Délai d'utilisation : Date de fabrication + 9 mois

## 5. CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg





## 6. PLAN DE COMPLEMENTATION

Sevrage en 10 semaines (2 repas par jour)

N° de semaine	Age du veau (en jours)	Lait entier/(en litres)	Lacvit maigre/repas (en grammes)	Eau/ repas (en litres)
1	1-2	3 repas de 1,5 litres de Colostrum		
	3-4	2 repas de 2 litres de colostrum		
	5-7	1,5		
2	8-10	1,5		
	11-14	1,5	50	0,5
3	15-17	2	50	0,5
	18-21	2	50	0,5
4	22-25	2	50	0,5
	26-28	2,5	75	0,5
5	29-35	2,5	75	0,5
6	36-42	2,5	90	0,5
7	43-49	2,5	90	0,5
8	50-56	2,5	75	0,5
9	57-63	2	50	0,5
10	64-65	1,5		
	66-70	1		

Mise à jour 09/2012

